

BebeDrill

A SZÁRAZ KÖHÖGÉssel KAPCSOLATOS TOROKIRRITÁCIÓ KEZELÉSÉRE

Használati utasítás

Mi a köhögés?

A köhögés a szervezet természetes, fontos reflexe, amely a légutak tisztántartását szolgálja. Különböző típusú köhögések vannak: a „produktív” köhögés, ami a köpet felkötésével kapcsolatos, vagy a száraz, „nem- produktív” köhögés, ami nem jár köpettel. A száraz köhögést szúró érzés kíséri a torokban, ami rendszerint éjjel felerősödik, és rontja az életminőséget. Ha kétsége van a köhögése milyenségét illetően, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

Mi a Bebe Drill szirup?

A Bebe Drill szirup cukor-, színezék és parabénmentes szirup, eper ízesítéssel.

A Bebe Drill szirup enyhíti a száraz köhögéssel kapcsolatos torokirritációt a torok bevonásával és nedvesítésével.

A Bebe Drill szirup speciálisan a 6 hónaposnál idősebb csecsemőknél, illetve legfeljebb 6 éves gyermekeknél történő alkalmazásra készült.

Hogyan hat?

Az összetétele miatt a Bebe Drill szirup védőfilmet képez és nedvesíti a torkot, ami lehetővé teszi a száraz köhögéssel kapcsolatos irritáció csillapodását, beleértve bizonyos külső káros hatások, például a cigaretta füst, légszennyezés, por, száraz levegő, stb. által okozott száraz köhögést is.

Összetétel

Glicerín, folyékony maltitol (E965), hidroxietil-cellulóz, nátrium-benzoát, citromsav-monohidrát, nátrium-citrát, eper ízesítés, tisztított víz.

Kiszerezés

125 ml-es tartály gyermekbiztos kupakkal.

5 ml-es beosztással ellátott adagoló pipetta a szájon át történő adagoláshoz.

SZÁRAZ KÖHÖGÉS ESETÉN


Szirup

CSECSEMŐ – GYERMEK részére 6 hónaptól 6 éves korig

Cukormentes, színezékmentes, parabénmentes

Ellenjavallatok

- 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők.
- Bármely összetevővel szembeni túlérzékenység.
- Örökletes fruktóz intolerancia, mivel a készítményben lévő maltitol fruktózzá alakul.



Figyelmeztetések és óvintézkedések

6-12 hónapos csecsemők esetén orvosi javaslat alapján alkalmazható.

A száraz köhögéssel kapcsolatosan jelentkező, súlyos állapot fennállásra utaló tünetek esetén forduljon kezelőorvosához. vlylen tünetek lehetnek pl. a nehézlégzés, 3 napnál tovább fennálló láz, ismételt hányás, táplálkozási nehézség, hasmenés, viselkedésbeli változások vagy alvászavarok. A száraz köhögés általában vírusfertőzéshez társul, de specifikus kezelést igénylő betegség (gégegyulladás, tüdőgyulladás, asztma, stb.) jele is lehet.

Ha szirup véletlenül a csecsemő/gyermek orrába, szemébe vagy fülébe kerül, normál sóoldatos öblítéssel kell a szirupot eltávolítani.

CSECSEMŐKTŐL/GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ, különösen a pipetta.


Pierre Fabre
HEALTH CARE

Hogyan kell alkalmazni a Bebe Drill szirupot?

A szirup alkalmazására vonatkozó információk

Használja a dobozban mellékelt adagoló pipettát.

Helyezze a pipettát a tartályba és húzza ki a fehér dugattyút a mennyiséget jelző fekete jelig. Így felszív egy 5 ml-es adagot.



Helyezze a gyermeket félülő vagy ülő helyzetbe, hogy ne nyelhesse félre a szirupot és helyezze a pipetta végét a szájába! A pipetta dugattyújának lassú nyomásával és a spriccelést elkerülve nyomja a szirupot a csecsemő/gyermek szájába, hogy lenyelhesse.

Ismételje meg ezt, ha szükséges, az alábbi adagolást követve.

Életkor	Adagolás
6-12 hónapos csecsemők	Alkalmazásonként egy 5 ml-es adag
1-6 éves gyermekek	Alkalmazásonként két 5 ml-es adag
3-4-szer 24 óránként, ha szükséges. Ha a tünetek 3 napon túl is fennállnak, forduljon kezelőorvosához.	

Ha elfelejtette beadni gyermekének a Bebe Drill szirupot a tervezett időben, ne adjon be kétszeres adagot.

Kövesse a javasolt adagolást alkalmazásonként a csecsemő/gyermek életkora szerint.

A pipettát minden alkalmazás után a dugattyú többszöri pumpálásával hideg vízzel öblítse át.

Győződjön meg róla, hogy a pipettát tisztán teszi vissza a dobozba.

A pipettára vonatkozó tájékoztatás

A sziruphoz mellékelt pipetta kifejezetten 5 ml Bebe Drill szirup adagolására szolgál.

Ha elveszítené, vagy megrongálódna, ne használja más készítmény pipettáját.

A pipetta műanyag része hőhatásra deformálódhat.

Ezért:

- ne használjon tisztításra készült háztartási gépeket, így mosogatógépet sem,
- ne sterilizálja hővel,
- ne tegye a pipettát mikrohullámú sütőbe.

Hogyan kell tárolni a Bebe Drill Szirupot?

A tartályban, szorosan lezárva, szobahőmérsékleten kell tárolni.

Az első felnyitást követően 3 hónapig használható.

Ne használja a lejárat dátum után (a tartály címkéjén és/vagy a dobozon található).

Szirup Pierre Fabre Medical Devices
29, avenue du Sidobre
81106 Castres Cedex – Franciaország



CE jelölés dátuma: 2013

A tájékoztató felülvizsgálatának dátuma: 2014. július.

Pipeta ROVIPHARM
ZA Lucinges
86, route du plan d'eau
01370 Treffort-Cuisiat – Franciaország



0459

Szimbólum

	Felhasználható
	Gyártási szám
	Figyelem, lásd a használati utasítást!
	Gyártó



Pierre Fabre
Consumer Health Care

UNE DIVISION PIERRE FABRE MÉDICAMENT